

## Poučení č. 26 Graftektomie

**Účel operace:** Graftektomie znamená odstranění nefunkční, případně symptomatické transplantované ledviny. Jako symptomatická je označována taková transplantovaná ledvina, která vyvolává následující příznaky - teplotu, zimnici, bolestivost v okolí štěpu.

**Nejčastější důvody, které vedou k provedení graftektomie:**

- cévní komplikace (trombóza renální žíly nebo tepny)
- akutní odhojení štěpu, které nelze zvládnout medikamenty
- septický stav způsobený infekcí v transplantované ledvině
- opakovaná přítomnost krve v moči (hematurie) s nutností krevních převodů
- podezření na nádor v transplantované ledvině
- selhání štěpu v důsledku jeho chronického odhojování
- **příprava před další transplantací**

**Povaha výkonu:** Ke graftektomii přistupujeme ze stejného řezu, jaký byl proveden při transplantaci. Po uvolnění ledviny od okolí, přerušíme cévní stopku a močovod a ledvinu odstraňujeme z těla nemocného. Do rány vložíme drenáž a operační ránu uzavřeme po anatomických vrstvách.

**Prospěch operace:** Tímto zákrokem zbavíme nemocného potíží, které mu způsobuje nefunkční, případně **symptomatický** štěp.

**Následky:** Neboť většinou odstraňujeme již nefunkční štěp a pacient již v té době chodí na pravidelné hemodialýzy, žádné další následky z provedené operace nevyplývají.

**Rizika a komplikace výkonu:** Jako každý chirurgický zákrok, má i graftektomie určitá rizika a komplikace. Tyto komplikace jsou však poměrně vzácné:

- během operace může dojít k poranění cév nemocného, ke kterým je ledvina našitá (1 % případů)
- krvácivé komplikace, které si mohou vyžádat operační revizi nebo podání transfuzí (5 % případů)
- existuje riziko poranění střeva (méně než 1 % případů)
- porucha hojení rány, infekce rány (3 % případů)
- krevní výron v ráně nebo v místě kde byla ledvina uložena (5 % případů)

**Alternativy:** Pokud nefunkční štěp způsobuje svému nositeli potíže, je nutné ho odstranit a neexistuje jiná alternativa léčby.

**Omezení v obvyklém způsobu života:** Samotná graftektomie po zahojení rány nepřináší nemocnému žádná omezení v obvyklém způsobu života. Jistá omezení mu způsobuje hemodialýza, ke které se nemocný musí vrátit.

**Omezení pracovní schopnosti:** je dáno základním onemocněním – chronickým selháním ledvin. Pokud pracujete, je předpokládána délka pracovní neschopnosti po graftektomii 4-6 týdnů.

**Léčebný režim:** Po operaci vám budou podávány léky proti bolesti. Alespoň měsíc po operaci byste se měli vyvarovat zvedání těžších břemen. Po zhojení rány je možné, že budete opět zařazen/a na čekací listinu k nové transplantaci ledviny. O tom rozhodne váš transplantolog na základě vašeho zdravotního stavu.

**Kontrolní zdravotní výkon:** nadále budete sledován/a v nefrologické ambulanci a dialyzačním středisku.